


Od dijagnoze do liječenja: Razumijevanje raka dojke

DIJAGNOZA
Svake godine gotovo
1,67 milijuna
ljudi diljem svijeta
sazna da ima
rak dojke.¹

ZNAKOVNI UKLJUČUJU²



Kvržicu ili
oteklinu
u dojci ili
pazuhi



Promjene u
veličini, obliku
ili teksturi
kože dojke



Promjene na
bradavici, npr.
uvlačenje, osip
ili iscijedak

Uznapredovali rak dojke (aBC)

Rani rak dojke (eBC)

DIJAGNOZA

Važno je identificirati tip i stadij raka dojke. Time će se odrediti liječenje i prognoza.

• Stadij

Prognoza je lošija što je rak proširen. Važno je rano dijagnosticirati i rano liječiti.³

• Tip

Različiti tipovi tumora imaju različiti biološki tijek i prognosu; npr. HER2-positivni rak dojke je agresivan. Ako se ne liječi, manje su mogućnosti preživljavanja i brže pogoršanje nego kod drugih tipova raka dojke.⁴

TIPOVI RAKA DOJKI

Rak dojke može se podijeliti u tri tipa, ovisno o prisutnosti abnormalnih količina specifičnih receptora (proteina) na površini stanica raka.⁵

80%

Hormonski receptor (HR)-pozitivan

Previše estrogenih receptora (ER) i/ili progesteronskih receptora (PR)

20%

Receptor epidermalnog faktora rasta 2 (HER2)-pozitivan

Previše HER2 receptora

10–20%

Trostruko negativni rak dojke (TNBC)

Bez abnormalnih količina ER, PR ili HER2 receptora

aBC

~10%

dijagnosticiranih s
uznapredovalim rakom
dijke (aBC; rak se
proširio izvan dojke
i/ili regionalnih limfnih
čvorova³)

eBC

~90%

dijagnosticiranih s
ranim rakom dojke
(eBC; rak se nije proširio
izvan dojke i/ili regionalnih
limfnih čvorova³)

LIJEČENJE eBC-a Cilj: izlječenje

Liječenje prije operacije (neoadjuvantno)⁷

- smanjuje tumor
- čini operaciju lakšom ili mogućom
- moguća operacija s poštedom dojke

Operativni zahvat⁸

- glavni način liječenja eBC-a
- mogući postupci:
 - lumpektomija – uklanjanje se samo kvržica
 - kvadrantektomija – uklanjanje se približno ¼ dojke
 - mastektomija – uklanjanje se cijela dojka

Liječenje nakon operacije (adjuvantno)⁷

- potencijalno ubija preostale stanice raka
- smanjuje mogućnost povrata bolesti

Neoadjuvantno i adjuvantno liječenje uključuje:

- | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------|
| | CILJANU TERAPIJU | | KEMOTERAPIJU |
| | HORMONSKU TERAPIJU | | RADIOTERAPIJU |

Nakon liječenja većina
bolesnica ide na redovite
mamografije (**rendgen
dijke**) kako bi se provjerilo
postoje li znakovi
povrata bolesti.

LIJEČENJE eBC-a Cilj: izlječiti

~1/3
bolesnica s
dijagnozom eBC-a
razvije aBC.⁹

LIJEČENJE aBC-a
Cilj: bolesnicama produljiti
život uz održanu kvalitetu
života što dulje.

SIMPTOMI¹⁰

Simptomi aBC-a mogu varirati
ovisno o tome koliko je rak proširen.
Najčešći su simptomi aBC-a:

SNAŽNA,
PROGRESIVNA BOL
U KOSTIMA

BOL U TRBUHU I
GUBITAK APETITA

PROGRESIVNA
GLAVOBOLJA,
MUCININU I
POVRAĆANJE

BOL U PRSIMA,
KAŠALJ I OTĚŽANO
DISANJE

ODLUKE O LIJEČENJU TEMELJE SE NA:

- KARAKTERISTIKAMA BOLESTI I BOLESNICE
- PRIJAŠNjem LIJEČENJU
- SKLONOSTIMA BOLESNICE I LIJEČNIKA

- Prvo liječenje aBC-a naziva se "prva linija liječenja".
- Kada prvi način liječenja prestane djelovati i stanje se pogorša, bolesnicama se daje nova vrsta liječenja ("druga linija liječenja").
- Bolesnicama se mogu dati daljnje linije liječenja ako im se stanje nastavi pogoršavati.

- liječenje bolesti
- ublažavanje simptoma
- ublažavanje nuspojava.